



Ingredientes por toma diária

%VRN*

Ingredientes	Quantidade	%VRN*
Vitamina C	500mg	625%
Eucalipto extrato seco da folha	150mg	n.d.**
Sabugueiro-negro extrato seco da flor	140mg	n.d.**
Andrographis extrato seco da planta	130mg	n.d.**
Pelargónio extrato seco da folha	120mg	n.d.**
Bromelaína 2500 GDU/g	70mg	n.d.**
Zinco	20mg	200%

*VRN: Valor de referência do nutriente

**n.d. não definido

1. O que é Antigripus e para que é utilizado

Antigripus® é um suplemento alimentar com uma associação única de Bromelaína e um complexo de plantas, reforçada com Vitamina C e Zinco, que contribuem para o equilíbrio do funcionamento do sistema imunitário. As alterações do equilíbrio do sistema imunitário podem manifestar-se por viroses (como gripes e constipações), alergias, infeções respiratórias, inflamações de garganta, tosse, cansaço e fadiga. **Antigripus®** tem uma fórmula enriquecida com Vitamina C e Zinco que contribui para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis, que consequentemente leva a uma maior resistência do organismo para os desafios do dia-a-dia.

2. Modo de tomar

Tomar 2 cápsulas por dia, ingeridas com água ao pequeno-almoço e jantar.

3. Precauções

Antigripus® não deve ser utilizado como substituto de uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. Pessoas que estejam sob medicação específica ou tenham alguma doença crónica, devem consultar o médico ou farmacêutico antes de tomar o Antigripus®. Não recomendado em crianças e adolescentes, gravidez ou aleitamento. É recomendada precaução em caso de toma do medicamento Metotrexato. É recomendada precaução nas pessoas que tomam anti-coagulantes orais. Não ultrapassar a toma diária indicada, salvo em caso de indicação médica. Não deve ser tomado em caso de alergia ou hipersensibilidade a qualquer componente da formulação, ou em caso de insuficiência renal. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Conservar a embalagem num local fresco e seco, protegido da luz. Retirar as cápsulas do blister apenas no momento da toma. Consumir de preferência antes do final da data de durabilidade mínima indicada na embalagem.