



Ingredientes por toma diária

%VRN*

Diosmina	580mg	n.d.**
Extrato de Ruscus aculeatus	280mg	n.d.**
Extrato seco de videira vermelha	80mg	n.d.**
Vitamina C	60mg	75

*VRN: Valor de referência do nutriente

**n.d. não definido

1. O que é VariNext e para que é utilizado

VariNext foi concebido para ajudar a manter a função e o desempenho da normal circulação sanguínea. Contribui para a diminuição dos sintomas e sinais relacionados com a insuficiência venosa (pernas pesadas, dor, cansaço, edema, calor, tensão, formigueiro, frieiras e câimbras). **VariNext** associa a Diosmina com Ruscus Aculeatus, juntamente com Videira Vermelha (Vitis Vinifera) e Vitamina C, contribuindo para a normal formação de colagénio e para o funcionamento normal dos vasos sanguíneos. A presença da Vitamina C, em associação com os outros constituintes, vem garantir uma resposta alargada e eficaz em todas as situações clínicas relacionadas com os vasos sanguíneos. **VariNext** contribui para o alívio sintomático de alterações funcionais dos vasos sanguíneos, das úlceras de origem venosa em associação com compressão e cuidados locais. **VariNext** contribui para o alívio sintomático da crise hemorroidária.

2. Modo de tomar

Tomar 2 comprimidos por dia, um de manhã e outro à noite, ou em alternativa, tomar 2 em toma única. Na crise hemorroidária, tomar 4 a 6 comprimidos por dia, repartidos em duas ou três tomas, em seguida voltar à toma recomendada.

3. Precauções e condições de conservação

Podem ocorrer distúrbios gastrointestinais. Em caso de diarreia deve suspender a toma. Não recomendado em crianças e adolescentes. Não ultrapassar a toma diária indicada, salvo em caso de indicação médica. Não deverá ser tomado em caso de alergia ou hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos constituintes da formulação. Pessoas que estejam sob medicação específica ou tenham alguma doença crónica, devem consultar o médico ou farmacêutico. Manter fora do alcance e da vista das crianças. Conservar em local fresco e seco. Conservar a embalagem de origem, para proteger da humidade. Retirar os comprimidos do blister apenas no momento da toma. Consumir de preferência antes da data limite de utilização indicada na embalagem.